

<p>در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱-۰ داخلی ۲۹۵</p>	
	<p>نام دارو: تتراسایکلین</p>
<p>زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک</p>	<p>موارد مصرف: آنتی بیوتیک</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تتراسایکلین در کودکان زیر ۸ سال منع مصرف دارند. زیرا می تواند باعث اختلال در ساخت استخوان و دندان شود و رنگ دندان ها را تغییر می دهد .</li> <li>• اگر تتراسایکلین در بارداری استفاده شود، می تواند با رسوب در دندانه های و استخوان جنین موجب ناهنجاری شود.</li> <li>• تاریخ مصرف تتراسایکلین اهمیت زیادی دارد، زیرا سبب آسیب کلیوی می شود.</li> <li>• تتراسایکلین در افرادی که حساسیت مفرط به دارو دارند، منع مصرف دارد.</li> <li>• تتراسایکلین در بارداری به خصوص در نیمه دوم بارداری منع مصرف دارد در شیردهی توصیه نمی شود.</li> <li>• موارد احتیاط در افرادی که دچار اختلال عملکرد کلیه و کبد یا در معرض نور خورشید و اشعه ماورا بنفش هستند.</li> <li>• تتراسایکلین اثر داروهای ضد انعقادی خوراکی را افزایش می دهد.</li> <li>• مصرف تتراسایکلین باعث کاهش تاثیر داروهای ضد بارداری خوراکی می شود.</li> <li>• مصرف همزمان آنتی اسید ها، کلسیم، آهن و منیزیم و لبنیات باعث کاهش جذب این دارو می شوند و باید ۳ تا ۱ ساعت فاصله باشد.</li> <li>• عوارض جانبی شامل سرگیجه، سردرد، کهیر، حساسیت به نور، تغییر رنگ در ناخن ها و دندان ها، زخم های دهانی، بی اشتها، تهوع، استفراغ، اسهال</li> </ul>	

- در صورت بروز افزایش حساسیت، اختلال عملکرد پیشرونده کلیه، عفونت ثانویه و یا اسهال شدید مصرف تتراسایکلین باید قطع شود.
- کپسول را با معده خالی و سر وقت معین (یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا) همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.
- مصرف همراه با غذا (مواد غذایی، شیر و لبنیات) جذب تتراسایکلین را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد. در صورت بروز علائم گوارشی، تتراسایکلین را همراه غذا مصرف نمایید ولی مواد غذایی مصرفی نباید حاوی شیر و یا لبنیات باشد.
- تتراسایکلین را در ظروف در بسته، محل خشک و به دور از نور و در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

واحد آموزش به بیمار