

<p>در صورت وجود هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار درمیان بگذارید. ۲۳۵۷۰-۲۱ داخلی ۲۹۵</p>	
	<p>نام دارو: داکسی سایکلین</p>
<p>زمان مصرف: بر اساس دستور پزشک</p>	<p>موارد مصرف: آنتی بیوتیک</p>
<ul style="list-style-type: none"> • داکسی سایکلین در کودکان زیر ۸ سال منع مصرف دارند. زیرا می تواند باعث اختلال در ساخت استخوان و دندان شود و رنگ دندان ها را تغییر می دهد. • تاریخ مصرف داکسی سایکلین اهمیت زیادی دارد • داکسی سایکلین در بارداری به خصوص در نیمه دوم بارداری، شیردهی، حساسیت مفرط و کودکان زیر ۸ سال منع مصرف دارد. • موارد احتیاط د اختلال عملکرد کلیه و کبد و افرادی که در معرض نور خورشید یا اشعه ماورا بنفش هستند می باشد. • مصرف داکسی سایکلین اثرات داروهای ضد انعقاد خوراکی را افزایش می دهد. • مصرف همزمان باریتوراتها، فنی توئین یا کاربامازپین باعث غیر فعال شدن این دارو می شود. • داکسی سایکلین اثر داروهای ضد بارداری خوراکی را کاهش می دهد. • عوارض جانبی شامل تهوع، استفراغ، کهیر، تغییر رنگ ناخن و دندان، بی اشتها می باشد. • در صورت بروز عفونت ثانویه، مصرف دارو باید قطع گردد. 	

- در صورت بروز اشکال در بلع و یا بلع دردناک مصرف دارو باید قطع گردد.
- داکسی سایکلین را همراه با آب فراوان مصرف نمایید تا مطمئن شوید که دارو به معده برسد زیرا در این صورت احتمال بروز ازوفاجیت (التهاب مری) کاهش می یابد.
- حداقل ۹۰ دقیقه بعد از مصرف دارو دراز نکشید زیرا اگر به سمت مری بازگردد و در مری باز شود می تواند باعث ایجاد التهاب و زخم در مری شود.
- در صورت ایجاد مشکلات گوارشی، می توان کپسول یا قرص داکسی سایکلین را همراه با غذا مصرف نمود.
- دارو باید سر وقت معین مصرف شود و علیرغم احساس بهبودی، درمان را مطابق دستور ادامه دهید.
- از مصرف آنتی اسید، مکمل های حاوی کلسیم، منیزیم و آهن یا فاصله ۱ تا ۳ ساعت پس از مصرف داکسی سایکلین، پرهیز نمایید.
- دارو را در ظروف در بسته، محل خشک و به دور از نور و در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

واحد آموزش به بیمار