

<p>در صورت وجود هرگونه سؤال یا نیاز به راهنمایی با بیمارستان تماس گرفته و با مسئول آموزش به بیمار در میان بگذارید. ۰۲۱-۲۳۵۷۰- داخلی ۲۹۵</p>	
	<p>نام دارو: فنوباربیتال</p>
<p>زمان مصرف</p>	<p>موارد مصرف: ضد صرع به خصوص در کودکان</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فنوباربیتال را دقیقاً مطابق با دستور پزشک خود مصرف و از تغییر دوز آن جدا پرهیز نمایید. معمولاً این دارو یک‌بار در روز مصرف می‌شود.</li> <li>• اگر مصرف دارو را ناگهان متوقف نمایید، ممکن است دچار علائم قطع مصرف (مثل بی‌خوابی، تحریک‌پذیری و اضطراب) بشوید و در صورتی که دارو را به دلیل صرع مصرف می‌کرده‌اید، امکان دارد دچار تشنج بشوید.</li> <li>• این دارو در صورت بارداری باید با احتیاط مصرف شود و جهت تنظیم مقدار دارو به پزشک مراجعه نمایید.</li> <li>• دارو را می‌توان با و یا بدون غذا مصرف نمود؛ اما رعایت این نکته بسیار مهم است که دارو را هر روز، مانند روزهای دیگر استفاده نمایید. (به عنوان مثال اگر دارو را با غذا مصرف نمودید بهتر است در هر نوبت مصرف، دارو را با غذا مصرف نمایید)</li> <li>• جهت کاهش علائم خواب‌آلودگی ناشی از مصرف دارو در طی روز، دارو را ۳۰ - ۶۰ دقیقه قبل از خواب مصرف نمایید.</li> <li>• در صورت بروز سرگیجه، خواب‌آلودگی و منگی باید احتیاط نمود و از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری و دقت دارد باید خودداری کرد.</li> <li>• با توجه به اینکه فنوباربیتال ممکن است باعث کاهش اثر قرص‌های ضدبارداری خوراکی گردد، پیشنهاد می‌شود در مدت مصرف این دارو از یک روش دیگر جلوگیری مثل کاندوم نیز استفاده کنید.</li> <li>• از مصرف الکل همراه فنوباربیتال باید خودداری نمود.</li> </ul>	