

مشکلات بالقوه در قرار گیری کاتتر

- درد
- آسیب عروقی
- کبودی
- عفونت

در صورت بروز موارد زیر به پزشک یا پرستار اطلاع دهید:

- ❖ درد
- ❖ قرمزی
- ❖ خونریزی
- ❖ مشکلات تنفسی جدید و یا تنگی نفس
- ❖ تغییر در ضربان قلب شما
- ❖ سرگیجه
- ❖ تب و لرز




کاتتر ورید مرکزی، لوله‌ای تو خالی است که وظیفه انتقال مایعات (خون، ادرار و ... بر اساس نوع وسیله) از داخل بدن انسان به بیرون یا بالعکس را بر عهده دارد. گاهی پزشکتان به شما دارو یا مایعاتی می دهد که لازم است از کاتتر ورید مرکزی برای شما استفاده شود.

موارد استفاده از کاتتر ورید مرکزی شامل درد، عفونت و سایر شرایط مانند سرطان یا مشکلات قلبی یا نمونه برداری برای آزمایش می باشد. گاهی نیز ممکن است از این طریق به شما مایعات، مواد مغذی و خون داده شود.


این کاتتر می تواند تعداد زیادی کانال‌های جداگانه یا لوله به نام لومن داشته باشد و با عمل جراحی در یک سیاهرگ بزرگ (مرکزی) در قفسه سینه قرار داده شود. کاتتر در زیر پوست تونل می زند، اما دهانه- های لومن از پوست بیرون می زند. کاتتر خارجی و پوست اطراف آن به مراقبت و شستشوی منظم نیاز دارند.



دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



عنوان آموزش: مراقبت از کاتتر ورید مرکزی



Code: R.H.P₇(OR)

اصول مراقبت از کاتتر

- همیشه دستان خود را قبل از دست زدن به کاتتر و رید مرکزی بشویید.
- هم بیمار و هم پرستار، در طول مدتی که با کاتتر کار می کنند از ماسک استفاده نمایند.
- سر کاتتر نباید در معرض هوای آزاد باشد و حتما باید کلامپ (بسته) باشد.
- از وارد آمدن ضربه و یا کشش به کاتتر بخصوص هنگام ورزش و توانبخشی جلوگیری نمایید.
- برای جلوگیری از کشیده شدن لوله ها آنها را با باند به بدن خود فیکس کنید. لوله ها را خم یا چین دار نکنید.
- در صورت استحمام کردن، حتما محل کاتتر پوشیده شده باشد و پس از استحمام پانسمان خشک و استریل قرار داده شود.
- توجه داشته باشید قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب حمام غوطه ور شود، برای استحمام نباید از دوش آب استفاده شود.



عوارض کاتتر گذاری:

آسیب در کاتتر:

کاتتر می تواند شیفت یا حرکت کند و یا در سیاهرگ پیچ و تاب بخورد. اگر اتفاق بیفتد، ممکن است نیاز به جایگذاری مجدد و یا حذف آن داشته باشید. هر نوع کاتتر ممکن است توسط خون لخته شده مسدود شود. شما می توانید این خطر را با شستشوی دقیق کاتتر طبق دستور به حداقل برسانید. گاهی اوقات یک لخته خون در اطراف کاتتر تشکیل می شود که می تواند باعث تورم در بازو، شانه، گردن یا سر شما شود. سریعا به تیم درمانی خود اطلاع دهید.

عفونت:

عفونت پوست می تواند از جایی شروع شود که کاتتر به درون بدن می رود. عفونت های جدی تر جریان خون نیز می تواند رخ دهد. تنها زمانی میزان بروز عفونت کم می شود که در موارد لازم شستشوی دست انجام شود و تعویض پانسمان با دقت صورت گیرد.

علائم عفونت:

- تب
- لرز
- ترشح از محل خروج کاتتر
- احساس ضعف و بیحالی عمومی

تهیه کننده :

حدیثه حروفی

کارشناس اتاق عمل

اتاق عمل

واحد آموزش به بیمار

Code: R.H.P7(OR)